

	Ce qui se passe	Le chien .....	Vous devez ....	Traitement
<p>Stress Excitation Exercice vigoureux Gros repas Boire en grande quantité Avaler de l'air Hérédité familiale.</p> <p><b>PHASE I</b></p> <p><b>PHASE II</b></p> <p><b>PHASE III</b></p>	<p>L'estomac fonctionne normalement.</p> <p>↕</p> <p>Le gaz commence à s'accumuler dans l'estomac. Et il ne se vide pas comme il le devrait.</p> <p>↓</p> <p>L'estomac commence à se dilater (dilatation gastrique).</p> <p>↓</p> <p>L'estomac se tourne sur lui-même (torsion).</p> <p>↓</p> <p>L'apport en sang à l'estomac est coupé. Les tissus de l'estomac sont endommagés par le manque d'apport sanguin. La veine Porte, la veine Cave ainsi que la veine Splénique se retrouvent comprimées et torsionnent. La rate devient aussi engorgée. L'état de choc commence à s'installer.</p> <p>↓</p> <p>Les tissus de l'estomac et de la rate deviennent de plus en plus nécrosés.</p> <p>↓</p> <p>L'état de choc est maintenant critique et sévère</p> <p>↓</p> <p>Des problèmes cardiaques commencent à se développer</p> <p>↓</p> <p>L'état de choc n'est plus réversible</p> <p>↓</p> <p>Mort</p>	<p>Le chien se comporte normalement.</p> <p>↓</p> <p>Le chien semble un peu inconfortable.</p> <p>↓</p> <p>Il devient anxieux, fait les 100 pas, essaie de vomir, de l'écume ferme et blanc peut se former, salive, l'abdomen peut commencer à se gonfler.</p> <p>↓ ↓</p> <p>Le chien gémit, halète, salive abondamment, tente de vomir à chaque 2 ou 3 minutes.</p> <p>Se tient les jambes écartées et la tête basse.</p> <p>L'abdomen est gonflé et semble creux lorsque légèrement tapé.</p> <p>Les gencives deviennent rouge foncé, les battements cardiaques deviennent autour de 80 à 100 battements par minutes, la température corporelle s'élève (104° F)</p> <p>↓</p> <p>Le chien a de la difficulté à se tenir debout ou si il le fait, les jambes tremblent.</p> <p>L'abdomen est très gonflé. La respiration est superficielle.</p> <p>↓</p> <p>Les gencives sont blanche ou bleu. Les pulsations cardiaques sont à plus de 100 battements par minute. Le pouls est très faible. La température corporelle baisse (98° F)</p>	<p>Garder le chien calme. Ne pas laisser le chien seul. Donner des antiacides selon la recommandation de votre vétérinaire. Donner du Phazyme™, extra fort en gélules.</p> <p>Être au courant des symptômes de la Phase I.</p> <p>Appeler votre vétérinaire et lui dire ce que vous suspecter et pourquoi. Aller chez votre vétérinaire sans aucun délai additionnel</p> <p>Demander à quelqu'un d'appeler votre vétérinaire pour l'avertir de votre arrivée et pourquoi vous allez le voir en urgence.</p> <p>Emmener votre chien au plus vite chez votre vétérinaire.</p> <p>La mort est imminente.</p> <p>Demander à quelqu'un d'appeler votre vétérinaire pour l'avertir de votre arrivée et pourquoi vous allez le voir en urgence.</p> <p>Emmener votre chien au plus vite chez votre vétérinaire</p>	<p>Pendant cette période, chien peut récupérer et ainsi les phases de la torsion peuvent ne pas se développer.</p> <p>Pendant cette phase, le chien peut s'en sortir si votre vétérinaire réussit à enlever la pression en intubant l'estomac.</p> <p>Pendant cette phase, le vétérinaire devra soulager l'estomac de la pression accumulée, commencer les intraveineuses et procéder à la chirurgie pour « détordre » l'estomac.</p> <p>Tout en faisant ce qui est énoncé ci-haut, le vétérinaire devra enlever une partie de l'estomac et de la rate. Il devra également utiliser des drogues assez puissantes afin de renverser l'état de choc.</p> <p>À ce stade, il n'est plus possible de sauver la vie du chien</p>

Personnellement, et je ne suis pas vétérinaire, dès que le chien montre des signes qu'il ne va pas bien, je donne 6 gélules extrafort de Phazymes™. Ce produit se retrouve en pharmacie.

Pourquoi des gélules? parce qu'elles se dissolvent très vite.

L'ingrédient actif et qui aide à soulager notre chien est le siméthicone.  
Il semblerait qu'il soit difficile de faire une « overdose » de siméthicone.

Après une période d'environ 10 minutes, le chien peut commencer à passer des gaz. Pour moi c'est un bon signe.

Si le chien ne va pas mieux, je redonne des gélules.

Je ne laisse jamais sans surveillance un chien qui ne va pas bien. Je le surveille étroitement et au moindre signes qui me font douter que la situation empire, je pars pour aller chez mon vétérinaire.

Au Chatelet Great Danois